



Naučná stezka Slatina

Výchozí místo

STROMY A SOUČASNÝ LES

Současný hvozď Dyleňského lesa je až na výjimky kulturního původu. Převažují porosty **smrku obecného** *Picea abies*, v nižších polohách je více zastoupena **borovice lesní** *Pinus sylvestris*. Místy je vysazen **modřín opadavý** *Larix decidua*.

Jedle bělokorá *Abies Alba*, která v přirozeném lese tvořila významný podíl, je dnes velice vzácná. Zbytky přírodě blízkých lesních porostů se zachovaly na silně podmačených půdách prameništ a rašeliništ (rašelinné a podmačené smrčiny, prameništ olšiny) a v nivách potoků (údolní jasano-olšové luhy). Vedle smrku a borovice rostou v těchto biotopech **olše lepkavá** *Alnus glutinosa*, **olše šedá** *Alnus incana*, **jasan ztepilý** *Fraxinus excelsior*, **javor klen** *Acer pseudoplatanus*, vzácně i **bříza pýřitá** *Betula pubescens*. Původně převládající kyselé bučiny se smrkem, jedlí a klenem se dochovaly v malých fragmentech, stejně jako přirozeně vzácnější květnaté bučiny. V obou případech dominoval ve stromovém patře **buk lesní** *Fagus sylvatica*, rozdílné však bylo zastoupení druhů v bylinném patře.

Pro současné lesní hospodářství je typická snaha o navrácení a rozšíření dřívě převládajících dřevin (zejména buku a jedlí), snaha o vytvoření stabilnějších lesních porostů a skloubení hospodářských a ekologických funkcí lesa.



Buk obecný



Olše lepkavá




Modřín opadavý



Olše šedá



Smrk obecný



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. – LESY PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ

